



Gliptines (Januvia®, Galvus®, Onglyza® of Trajenta®)

De huisarts heeft voor je diabetes Januvia®, Galvus®, Onglyza® of Trajenta® opgestart.

Deze medicatie stimuleert de pancreas om meer insuline te maken. Ze veroorzaakt geen te lage bloedsuiker (hypo), want de werking stopt als je bloedsuiker te veel daalt.

Wanneer innemen?

- ◆ Gliptines kunnen op elk tijdstip van de dag ingenomen worden. Je neemt je medicatie wel best elke dag op hetzelfde tijdstip in.
- ◆ Januvia® / Onglyza® / Trajenta®: 1 inname per dag.
- ◆ Galvus® : 2 innames, gespreid over de dag (tenzij bij verminderde nierfunctie, dan 1 inname per dag).

Opvolging

Laat je huisarts na enkele weken je bloedsuiker controleren. Zelf je bloedsuiker controleren met een eigen bloedglucosemeter is meestal niet nodig (omdat er geen gevaar is voor een te lage bloedsuiker).

Laat je huisarts om de 3 maanden bloed nemen voor dosage van HbA1c. Dit geeft een idee over de gemiddelde bloedsuikerspiegel van de laatste 3 maanden.

Deze informatie vervangt geen individuele begeleiding.

DiabetesProject Aalst

Leopoldlaan 44
9300 Aalst

Telefoon: 053 41 97 24

E-mail: dpa@zorgtrajectenaalst.be