



Trulicity®

Je huisarts heeft voor je diabetes **Trulicity®** voorgeschreven. Deze medicatie moet worden ingespoten. Ze werkt via het **incretinesysteem**. Dit is een hormoonsysteem dat een gunstig effect heeft op de bloedsuiker en het gewicht. Deze medicatie stimuleert de pancreas om meer insuline te maken.

Trulicity® veroorzaakt op zich **geen te lage bloedsuiker** (hypo) want Trulicity® stopt met werken als je bloedsuiker te veel daalt. Bij gebruik in combinatie met andere bloedsuikerverlagende medicatie, kan de bloedsuiker wel te veel dalen.

Trulicity® vertraagt de maaglediging en werkt zo eetlustremmend. Vaak leidt dit tot een **daling van het gewicht**. De trage maaglediging kan misselijkheid veroorzaken. Dit treedt vooral in het begin van de behandeling op en verdwijnt meestal bij langer gebruik.

Wanneer injecteer je Trulicity®?

Slechts 1 x per week, onafhankelijk van de maaltijd. De gevulde pen is direct klaar voor gebruik.

Aandachtspunt

Misselijkheid!

Enkele tips:

- ◆ Eet kleinere porties (halveer de maaltijd)
- ◆ Neem de tijd om rustig te eten
- ◆ Beperk vette producten
- ◆ Vermijd sterk gekruide eten en koolzuurhoudende dranken

Opvolging

Het is handig om zelfcontrole aan te leren. Je kan een bloedglucosemeter en teststrips bekomen bij het afsluiten van een zorgtraject diabetes.

Voorstel voor zelfcontrole:

- ◆ Eenmaal per week: glycemiecontrole voor het ontbijt en het avondmaal
- ◆ Om de 3 weken: volledige dagcurve (voor de maaltijden en voor het slapen)

Laat om de 3 maanden bloed nemen voor de evaluatie van HbA1c. Dit geeft een idee van de gemiddelde bloedsuikerspiegel van de laatste 3 maanden.

Deze informatie vervangt geen individuele begeleiding.

DPA Lifestyle

Burchtstraat 10 bus 10

9300 Aalst

Telefoon: 053 73 31 60

E-mail: afspraakdpa@gmail.com